

KABUTO^{MC}

866 613 3336
ENGAGEAGRO.COM

DÉFENDEZ
VOTRE
GAZON



FONGICIDE KABUTO^{MC}

Le fongicide KABUTO^{MC} offre une toute nouvelle matière active exclusive pour la suppression de la brûlure en plaques dans les gazons professionnels.

- Protection puissante contre la brûlure en plaques
- Défense contre la résistance
- Facile à utiliser




KABUTO^{MC}

Protection puissante contre la brûlure en plaques

L'isofétamide, la nouvelle matière active unique en son genre de Kabuto, exerce une activité systémique locale hautement efficace contre la brûlure en plaques.

Comparaison de la suppression de la brûlure en plaques sur 14 jours



Résumé des données de 2010 et 2011. Applications effectuées à 14 jours d'intervalle. Doses sont données pour une superficie de 100 m².

Défense contre la résistance

KABUTO est un SDHI, une classe de fongicides du groupe 7. Ceci en fait un excellent produit de remplacement des DMI (groupe 3) et des autres groupes de fongicides surutilisés lorsqu'on cherche à maîtriser la brûlure en plaques tout en évitant la résistance aux fongicides.

Les SDHI ne sont pas tous pareils. KABUTO est un SDHI de 4^e génération dont l'efficacité a été démontrée contre des maladies résistantes aux autres SDHI, grâce à sa structure chimique exclusive.



Facile à utiliser

Nous savons qu'au cœur de la saison, il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur et que chaque minute compte. La facilité d'utilisation de Kabuto a été conçue pour ça.

- Formulation : suspension concentrée
- Flacon avec système de mesure intégré
- Faibles doses d'emploi
- Conditionnement pratique – 4 bidons/caisse
 - Un bidon de 2 L traite la plupart des verts
 - Deux caisses traitent la plupart des allées
 - Facile à manipuler et à entreposer

COUVERTURE

Format	Faible dose 12,7 ml/100 m ²	Forte dose 15,9 ml/100 m ²
1 bidon	3,89 acres 1,57 Ha	3,11 acres 1,25 Ha
1 caisse	15,5 acres 6,25 Ha	12,4 acres 5 Ha
2 caisses	31 acres 12,5 Ha	24,9 acres 10 Ha

Conditionnement novateur

KABUTO est offert dans un bidon à deux compartiments spécialement conçu, avec système de mesure intégré pour faciliter et améliorer la rapidité et la précision du mélange et du chargement.

DIRECTIVES D'UTILISATION

LTURE	MALADIE	DOSE	INTERVALLE	REMARQUES
Gazon (golf et gazonnières)	Brûlure en plaques (<i>Sclerotinia homoeocarpa</i>)	12,7 – 15,9 ml/100 m ²	14 Jours	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer préventivement ou dès le début du développement de la maladie • Appliquer dans au moins 8 L d'eau aux 100 m² • Ne pas faire plus de deux applications consécutives sans alterner avec un produit ayant un mode d'action différent.

Toujours lire les directives de l'étiquette et s'y conformer.

ENGAGE AGRO

tél. 866.613.3336
info@engageagro.com
www.engageagro.com

KABUTO^{MC} est une marque de commerce d'Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.
 Daconil[®] et Banner Maxx[®] sont des marques déposées d'une compagnie du groupe Syngenta.
 Cadence[®] est une marque déposée de BASF AG, utilisée sous licence par BASF Canada Inc.
 Eagle[®] est une marque déposée de Dow AgroSciences.

