

// UTILISATION OPTIMALE

Fourmis, punaises des céréales, ver gris, pyrale des prés et tiques infestant le gazon

// PRINCIPAUX POINTS FORTS

DeltaGard^{MD} SC est un insecticide très efficace à de très faibles taux d'application; il agit rapidement au contact pour maîtriser les fourmis, les punaises des céréales, le ver gris, la pyrale des prés et les tiques infestant le gazon. L'ingrédient actif de DeltaGard SC est la deltaméthrine, un insecticide pyréthroïde de troisième génération.

Le mode d'action de la deltaméthrine diffère de celui des organophosphorés et des carbamates. En effet, la deltaméthrine ne se lie pas à la cholinestérase et n'inhibe pas cette enzyme. Elle agit plutôt sur le système nerveux des insectes en modifiant la solubilité de la membrane des cellules nerveuses (neurones). DeltaGard SC altère la transmission des messages envoyés par le cerveau des insectes en bloquant l'influx nerveux, entraînant une paralysie et un effet de choc rapide. Ce mode d'action en fait un insecticide très efficace contre les insectes tout en étant peu toxique pour les mammifères. La deltaméthrine agit au contact et par ingestion.

Caractéristiques de DeltaGard SC

- Efficacité élevée
- Action rapide
- Insecticide de surface à large spectre
- Pyréthroïde de synthèse de troisième génération (amélioré)
- Très faibles taux d'application
- Faible impact environnemental et faible toxicité mammalienne
- · Préparation liquide facile à mélanger et à appliquer
- Faible odeur
- Excellent produit pour les programmes de lutte intégrée

DeltaGard SC est efficace contre les ravageurs suivants :

fourmi



tique

// APPLICATION DE DELTAGARD SC

Pour les gazons denses et/ou coupés long, il est recommandé d'utiliser un volume minimal de 10 L d'eau par 100 m². Ne pas tondre ou irriguer dans les 24 heures suivant l'application.

Principales insectes contrôlées

Insecte	Recommandations	Taux
Punaises des céréales, pyrales des prés, vers gris, fourmis	Application au sol: Appliquer en présence d'insectes ou de signes indiquant qu'ils s'alimentent. Dans les cas d'infestation grave, une deuxième application peut être nécessaire 2 ou 3 semaines plus tard.	1,2 L dans 600-1 500 L d'eau par ha
	Pour les gazons denses et/ou coupés long et/ou comportant du chaume, il est recommandé d'utiliser un volume minimal d'eau de 10 L par 100 m² pour s'assurer que le produit traverse le chaume.	(12 mL dans 6-15 L d'eau par 100 m²)
	Appliquer DeltaGard SC en pulvérisation grossière dans un minimum de 8 L d'eau par 100 m ² comme suit :	
Tiques	Appliquer sous forme de bande de 3 mètres sur le gazon le long du périmètre de la propriété et autour des structures où les tiques représentent un problème, comme les niches, les chenils, les trottoirs, les voies de passage piétonnier ou les patios.	
	Les zones gazonnées particulièrement propices aux tiques comprennent celles qui sont adjacentes à des zones boisées, à des murs de pierre, à des plates-bandes ornementales et à d'autres aires de végétation excessive.	12 mL dans au moins 8 L d'eau par 100 m²
	Restreindre l'habitat des tiques au moyen de techniques d'aménagement paysager, comme la tonte du gazon, l'enlèvement des mauvaises herbes et le ramassage des feuilles et des autres débris où les tiques peuvent se cacher.	



Ontario: Ryan Beauchamp 226.545.0413 Ontario: Keith Bartlett 226.821.2356 Ouest du Canada: Josey Groenveld 403.463.2742 Provinces de l'Atlantique: Québec: Tim Steen Normand 226.820.5412 514.949

Québec: Normand Drapeau 514.949.2467

es.bayer.ca

1-888-283-6847

